

蘇木

豆科

林榮貴·葉正龍



【學名】*Caesalpinia sappatin* L.

【別名】蘇方、蘇枋、紅蘇木(廣西)、戈梅芳(雲南)。

【產地】台灣在 1645 年首次引進，栽植於墾丁國家公園內，南部地區有栽培於庭園或花園。

【分佈】印度、馬來西亞、爪哇等溫帶地區。

【形態】常綠小喬木，樹幹及樹枝均有疏刺，有明顯圓點狀皮孔，新枝被微毛，後脫落。葉互生，為二回羽狀複葉，羽片 18~26 枚，小葉 10~17 對，葉形為長橢圓形或卵狀長橢圓形，先端鈍，略微凹入，全緣。花黃色，為圓錘花序，頂生或腋生，寬大多花，被短柔毛；萼管短，倒卵錘形，萼片 5 裂，裂片略不整齊；花瓣 5 片，其中 4 片圓形等大，最下一片較小。雄蕊 10 枚，花絲下部密被綿毛，子房生棕色絨毛。莢果木質，成熟褐色，倒卵狀矩圓形，扁平，厚，無刺，頂端斜截形，有尾尖成熟二裂，種子 2~4 粒。

【採製】全年可採，蘇木的心材切片，曬乾。

【性味】味甘、鹼、性平。

【效用】有行血破瘀、消腫止痛的功能。用於經閉、產後瘀血、跌打損傷、黃疸型肝炎、尿路感染、腹痛胸悶、慢性腸炎、腸出血、吐血等。※月經過多及孕婦忌用。

【民間驗方】

1. 治產後瘀阻腹痛：配乳香同煎，加少量酒內服。
2. 治血滯經閉：與凌霄花、當歸尾、川紅花、川牛膝、赤芍同用。
3. 治跌打損傷、瘀滯腫痛之症：與乳香、沒藥、血竭、川紅花等同用。
4. 治行血不良、全身酸痛：蘇木 7 錢，一條根、艾草頭各 5 錢，紅花 2 錢，水煎服。
5. 治急性肝炎：小本七層塔 1 兩半，蘇木、桶鉤藤、忍冬藤、枸杞根各 1 兩，水煎服。
6. 治腳氣腫：蘇木、白茅根各 1 兩，水丁香、淡竹葉各 5 錢，天門冬、車前子各 4 錢，支子 3 錢，(孕婦用澤瀉 7 錢與參鬚 4 錢，如用蘇木會流產)。