

大薊

菊科

林榮貴·葉正龍

【學名】*Cirsium japonicum* DC.

【別名】虎薊、雞腳刺、雞角刺。

【產地】台灣全島平野至中央山脈高海拔向陽之草原。

【形態】多年生草本。株高 80~120cm。根長圓錐形，簇生。莖直立，有細縱紋，基部具白色絲狀毛。基生葉有柄，開花時不凋落，呈蓮座狀，葉片倒披針形或倒卵狀橢圓形，長 12~

30cm，羽狀深裂，裂片 5~6 對，長橢圓狀披針形或卵形，邊緣齒狀，齒端有尖刺，上面綠色，疏生絲狀毛，下面灰綠色，脈上有毛；中部葉無柄，基部抱莖，羽狀深裂，邊緣有刺；上部葉漸小。夏季開花，紫紅色，頭狀花序單一或數個生於枝端集成圓錐狀；總苞鐘形，長 1.5~2cm，寬 2.5~4cm，苞片長披針形，多層。

【採製】夏、秋間採根或全草。

【性味】甘、苦、涼，入肝、脾經。

【效用】有涼血止血、祛痰、消癰腫、安胎止血、破宿血、生新血之效。為治血要藥，主治吐血、便血、尿血、腸風、癰腫、子宮出血、肝炎、腎炎、跌打損傷、帶狀泡疹、燙風傷、高血壓、骨刺。

【應用】1.治肺癰：大薊 4 兩，煎湯，早、晚飯後服用。

2.急性肝炎：鮮品 4 兩，水煎酌加紅糖調服。

3.月經不調、痛經、白帶：本品 3~5 錢，水酒煎服或月經乾淨前一天，開始連續服用 3 天。

